

RODIFEN

Esca topicida-ratticida pronta all'uso a base di Difenacoum.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Difenacoum	g	0,005
Denatonio benzoato puro	g	0,001
Coformulanti, sostanze appetenti e coloranti q.b. a	g	100

IL PRINCIPIO ATTIVO

Il Difenacoum appartiene alla seconda generazione di anticoagulanti rodenticidi. È dotato di eccezionale efficacia sia come topicida sia come ratticida anche contro i roditori ormai resistenti agli anticoagulanti della 1° generazione.

Se ingerito in quantità sufficiente è letale anche una sola ingestione. Il principio attivo è ad azione anticoagulante e pertanto i roditori che ingeriscono le esche muoiono nel giro di qualche giorno per emorragie interne senza destare sospetto negli altri componenti la colonia.

Per ragioni di maggior sicurezza, soprattutto nei confronti dei bambini, RODIFEN contiene Denatonio Benzoato, che è considerato la sostanza più amara del mondo: inserita nelle esche topicide alla dose di 10 ppm (0,001%), può essere avvertita dal palato umano conferendo al formulato un sapore amarissimo che lo rende immangiabile. Alle stesse dosi non ha alcun effetto sui roditori che, quindi, se ne cibano avidamente.



LE CARATTERISTICHE

Per produrre la morte dei roditori sono richieste minori quantità di RODIFEN: dal 50 all'80% dei roditori muoiono dopo una sola ingestione. Per questo motivo RODIFEN può essere considerato "un anticoagulante a dose singola". In pratica il consumo di RODIFEN nelle derattizzazioni risulta inferiore agli altri tipi di esche contenenti principi attivi anticoagulanti della 1° generazione.

L'APPLICAZIONE

RODIFEN viene rapidamente accettato dalle diverse specie di roditori senza che si sviluppi diffidenza nei confronti dell'esca.

Una delle regole essenziali per ottenere buoni risultati è quella di mantenere a disposizione dei roditori quantità esuberanti di esca fintanto che essi non cessano di nutrirsi. Le esche vanno disposte in più punti vicini uno all'altro in modo che i roditori possano incontrarle e consumarle facilmente, senza dover competere fra loro.

Nella prima fase della derattizzazione è importante che i punti di distribuzione siano spesso controllati (anche giornalmente) per reintegrarli di esca in modo da consentirne un regolare consumo nell'arco dei primi 2-3 giorni.

RODIFEN è disponibile in varie formulazioni che ne permettono l'impiego in ogni condizione (luoghi umidi, locali polverosi, presenza di sorgenti di cibo competitive, ecc), soprattutto se associate all'uso di adatti erogatori (RISTORAT, linea PROTECTA, BAIT DISPENSER, ecc).

LA FORMULAZIONE

RODIFEN è disponibile in pellet, farina, fioccato, grani, frumento, zollette paraffinate, candelotti con gancio paraffinati, bustine sfarinate, cilindri. Queste forme fisiche sono utilizzabili in ogni condizione (luoghi umidi, locali polverosi, presenza di sorgenti di cibo competitive, ecc), soprattutto se associate all'uso di adatti erogatori (RISTORAT, linea PROTECTA, ecc).

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Presidio Medico - Chirurgico. Uso civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.14354.

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - RODIFEN è classificato NON PERICOLOSO e perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di pericolosità.